

6 主要果樹の品種特性等一覧

品種	県内栽培面積 (ha)	品種特性等
＜温州みかん＞		
極早生種		
高林早生	72.1	浜松市の高林氏により発見された興津早生の一樹変異。
宮本早生	2.2	和歌山県で発見され幅広く栽培されている。
日南1号	26.6	宮崎県で発見された興津早生の枝変わり。
ゆら早生	121.5	和歌山県で発見された宮川早生の枝変わり。極早生種としては糖度高い。
早生種		
宮川早生	287.3	糖度が高く味わいがある。ハウスみかんの主力品種。
興津早生	369.4	宮川より果形扁平で、糖度も高く、熟期も1週間程早い。
中生種		
繁田温州	5.1	11月下旬から12月上旬に収穫、年内出荷向け。
普通温州		
青島温州	1,666.2	大果で極めて扁平。晩熟で貯蔵性に富む。
寿太郎温州	237.9	沼津市の山田氏により発見された青島温州の枝変わり。青島より小さく浮皮が少ない。
片山温州	50.8	酸味が少なめで甘みが強い。果汁が多く濃厚な味わい。
＜中晩生柑橘類＞		
ネーブルオレンジ	74.4	森田ネーブル、白柳ネーブルは本県で発見されたワシントンの枝変わり品種。
スルガエレガント	-	なつみかんの一つ。果皮がなめらかでさわやかな甘さと香りが特徴。
ボンカン	50.4	主な品種は静岡市の太田氏により発見された「太田ボンカン」。
不知火	43.8	清見×ボンカン。約250gで特有の突起があり特徴的な形。
はるみ	72.0	清見×ボンカン。約200gで果皮がむきやすく、じょうのう膜も薄く食べやすい。
日向夏	44.7	200～300g位で果皮と果肉が薄黄色。白い綿状のアルベドと一緒に食べる。
清見	12.0	宮川早生×トロビタオレンジ。みかんの甘酸っぱさとオレンジの濃厚な風味が特徴。
せとか	8.4	濃い橙色で見た目が美しい。独特の芳香があり甘みが強い。
黄金柑	0.8	春先に食べられる小ぶりの果実。皮はむきやすく爽快な香り。
ダイダイ	15.9	ダイダイ酢等への加工向き。「代々栄える」にちなんで正月用飾りとしても利用される。
キンカン		
こん太	-	静岡市の近藤氏により発見されたニンボウキンカンの枝変わり種。

資料：令和4年産特産果樹生産動態等調査

< 落葉果樹 >

ぶどう		
シャインマスカット	3.3	成熟期の果皮は黄緑色。食感と食味が良好。
ピオーネ	4.2	巨峰×カノンホールマスカット。成熟期は8月下旬から9月上旬。
巨峰	0.9	成熟期は8月下旬から9月上旬。
なし		
幸水	34.8	8月中～下旬に熟す赤ナシ。酸味がなく特有の香りがある。
豊水	27.1	9月上～下旬に熟す赤ナシ。シャキッとした食感と程よい酸味が特徴。
新水	1.3	8月上～中旬に熟す赤ナシ。糖度が高く、酸味もあり濃厚な食味。
喜水（静喜水を含む）	2.5	名月×豊水。7月中下旬が熟期。
もも		
日川白鳳	9.1	果皮の着色が容易で、品質も良好。
さおとめ	1.0	早生種としては食味良好で、果皮の着色も容易。果実はやや小さめ。
はつおとめ	3.0	極早生品種で、やや小ぶりであるが色づきが良く、香りが強い。
柿		
次郎（早生系次郎含む）	112.0	収穫時期は10月中旬から11月上旬。完全甘ガキ。森町産まれの品種。
四ツ溝	40.4	渋ガキで四つの溝がある尖ったハート型が特徴。
富有	14.0	成熟期は11月上旬から中旬。完全甘ガキ。
キウイフルーツ		
ヘイワード	28.2	果肉は鮮やかなエメラルドグリーンでキウイフルーツの主力品種。
レインボーレッド	4.1	種子の周辺が鮮赤色となる。収穫期はヘイワードより早い。
東京ゴールド	4.8	果肉が黄色で果頂部が尖った果形が特徴。
イチジク		
柘井ドーフィン	-	主力品種で中遠・志太榛原地区で栽培が盛ん。

資料：令和4年産特産果樹生産動態等調査